

## EPRAC AVEC VIS KLS

### EXPANSION PALATINE RAPIDE ASSISTÉE CHIRURGICALEMENT

#### PROCÉDURE

Il s'agit d'élargir le palais avec un appareil d'expansion semblable à celui que nous utilisons chez les enfants. Pour y arriver il est nécessaire de relâcher chirurgicalement la suture du palais qui est complètement fusionnée chez l'adulte.



Il s'agit d'une intervention chirurgicale de 45 minutes qui est faite sous anesthésie générale. C'est une chirurgie d'un jour et le patient n'a pas à dormir en milieu hospitalier.

Il est nécessaire de rencontrer le chirurgien avant l'intervention. Il vous expliquera les conseils d'usage et les risques opératoires. Il recommandera aussi les examens préalables à l'anesthésie générale. La mise en place de la vis d'activation sera faite lors de l'intervention chirurgicale.

#### APRÈS L'INTERVENTION

On désire voir le patient 2 à 4 semaines après la chirurgie pour vérifier l'état des tissus mous, de la vis et poursuivre les activations de la vis. On voit le patient aux 14 à 20 jours durant l'activation pour s'assurer que tout se passe bien.

Lors de l'expansion du palais, il est normal de :

- ressentir de la douleur au palais, à la base du nez ou même à la base des yeux, car l'os du maxillaire s'élargit. La prise de Tylenol® ou Advil® peut être nécessaire.
- voir un espace se créer entre les deux dents avant supérieures est un signe de succès du traitement. Cet espace va se refermer en partie par lui-même et le reste se fermera avec les boîtiers orthodontiques.

## EPRAC AVEC VIS KLS

- avoir de la difficulté à parler avec ce nouvel appareil (la vis) en bouche. Après quelques jours, vous aurez acquis beaucoup plus de facilité. Faire de la lecture à voix haute aide grandement à l'adaptation.
- avoir de la difficulté à la mastication, un peu de patience et le tout se rétablira. Il faut toutefois comprendre qu'une occlusion complètement confortable sera acquise seulement après plusieurs mois avec les appareils fixes (broches).

### ACTIVATIONS

Il est important de suivre la procédure pour les activations, elle vous sera démontrée en clinique et vous pouvez nous appeler en tout temps pour toutes questions.

### PRÉCAUTIONS

- Il est important de ne rien manger de trop collant ni de trop dur, car cela pourrait briser la vis.
- Vous devez bien nettoyer vos dents et votre vis autant autour du palais que dans la région de la vis d'expansion.
- Si une douleur anormale ou une décoloration survient à vos dents avant, contactez-nous immédiatement et cessez les activations, nous devons évaluer la situation avant de réactiver la vis.
- De même si vous voyez une asymétrie se créer au niveau de vos dents, vous devez cesser les activations et prendre rendez-vous pour une vérification.

Encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des inquiétudes, nous sommes là pour vous soutenir dans votre démarche.

En cas d'urgence, vous pouvez consulter notre site web au [www.orthodontistesquebec.com](http://www.orthodontistesquebec.com) sous l'onglet « **Urgence** ».

N'hésitez pas à nous joindre pour tout problème ou question.

Dr Luc Veilleux, orthodontiste, D.M.D., M.Sc., FRCD(C)